

## Статистика алиментарных заболеваний

Алиментарные заболевания относятся к числу наиболее распространенных. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среди проблем мирового здравоохранения одно из первых мест занимает недостаточность питания.

В настоящее время десятки миллионов людей в развивающихся странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки и среди малообеспеченных слоев населения других капиталистических стран страдают белково-энергетической недостаточностью, включая ее тяжелые формы — квашиоркор и алиментарный маразм, выраженной недостаточностью витаминов — авитаминозами, тяжелой недостаточностью йода, железа и т. д. Последствия тяжелых нарушений питания, особенно у детей, часто носят необратимый характер, отражаясь на физических и психических функциях организма. Болезни недостаточного питания повышают восприимчивость к инфекциям, отягощают их течение, а также течение других заболеваний. Основной или дополнительной причиной смерти детей в неразвитых странах является количественно и качественно неполноценное питание. Так, в Африке на 1-м году жизни умирает 180 — 200 детей на 1000 новорожденных. Уместно отметить, что в дореволюционной России каждый четвертый ребенок умирал на 1-м году жизни, а за годы Советской власти детская смертность снизилась более чем в 10 раз